

Divovske bundeve

Drvodelić, Damir

Source / Izvornik: **Gospodarski list, 2010, 169, 23 - 23**

Journal article, Published version

Rad u časopisu, Objavljena verzija rada (izdavačev PDF)

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:108:500277>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-08-10**



Repository / Repozitorij:

[University of Zagreb Faculty of Forestry and Wood Technology](#)



Divovske bundeve

Bundeve (*Cucurbita maxima*) ubrajaju se u najstarije kultivirane biljke. One spadaju među najraznovrsnije među svim biljkama u prirodi. Zbog prilagodljivosti različitim uvjetima okoline, raširene su po cijelom svijetu, a raznolikost im omogućuje bezbroj načina upotrebe.

Meso bundeve sadrži dosta karotina (provitamina A), škroba, šećera i minerala. Od nje se mogu pripravljati različita jela. Mlada bundeva se priprema kao varivo, a zrela se može koristiti pečena. Najbolja je za pripremu bučnice.

Američka divovska bundeva

Sorta „Atlantic“, razmnožava se sjemenom, a sjemenke se mogu sijati u tresetne tablete



Američka divovska bundeva „Atlantic“

(po 1) u travnju, a zatim se presađuju u dobro pripremljene kućice sredinom svibnja – kad prođe opasnost od mrazeva.

Kad se siju direktno na otvoreno (u svibnju na kontinentu,

a u travnju u Primorju), tad se u kućicu stavljaju na dubinu od 3 do 5 cm 2-3 sjemenke, dobro povlaže i prekriju folijom ili staklom. Kad sjeme nikne, tad se zaklon skloni i biljka se dalje normalno razvija. U vrijeme cvjetanja, zametanja plodova i razvoja intenzivno se njeguje.

Uvjeti uzgoja

Odlikuje se velikim zahtjevima u pogledu topline, vlage, svjetlosti i hranjivih tvari, te joj za uzgoj ponajbolje odgovaraju ravničarski i topli krajevi. Ova bundeva je veliki „izjelica“, te traži ponajbolja tla, dobro nagnjena stajnjakom. Dobra varijanta sjetve je u neposrednoj blizini hrpe sagorjelog stajnjaka.

„Atlantic“ divovska bundeva ima golem genetski potencijal. Tako je 1993. godine u Americi uzgojena najveća bundeva svih vremena – 401,3 kg. Ova bundeva zameće više plodo-



Velika njemačka bundeva „Zentner“

va, ali ih biljka najčešće odbaci kod težine od 3 do 5 kg. Ako se uzgaja 1 plod, tada on može lako težiti od 100 do 200 kg; ako su 2 ploda, težina se dijeli. Težina se povećava uz intenzivnu njegu: čestim zalijevanjem ili navodnjavanjem, povremenim prignojavanjem i dodatnim zakorjenjivanjem vriježa u „rezervnim“ kućicama.

Velika njemačka bundeva

Naziv sorte je „Zentner“ i postoji u tri varijeteta: crvena, narančasta i žuta i relativno se lako uzgaja. Plodovi mogu biti glatki ili rebrasti, a variraju po težini od 15 do 50 kg. Trebaju se držati na vriježi i tako će dobiti na kakvoći. Mladi se plodovi mogu pohati, pržiti ili od njih raditi varivo. Zreli se plodovi koriste na razne načine: mogu se raditi pite, stavljati u juhe...

Da biste uzgajali ove bundeve, trebate već od sredine travnja proizvesti presadnice. To je najbolje činiti u tresetnim tabletama ili u čašama od jogurta napunjenim mješavinom sagorjelog stajnjaka i prvoklasnoga humusa, a zatim ih presaditi u dobro pripremljene kućice sredinom svibnja – kad prođe opasnost od mrazeva.

Odlikuje se velikim zahtjevima u pogledu topline, vlage, svjetlosti i hranjivih tvari, te joj za uzgoj ponajbolje odgovaraju nizinski i topli krajevi.

Divovska francuska bundeva

I ova sorta poznata pod nazivom „Gargantua“ ima

golem genetski potencijal, često prekoračujući 250 kg, a težina od 200 kg sigurno se može uzgojiti i u našim uvjetima, svakako, uz intenzivnu njegu i brigu. Osim spektakularnosti, ta golema bundeva omogućuje jeftino prehranjivanje živadi i životinja na imanju za vrijeme zime.

Sjetva ove sorte preporučuje se na otvorenom u travnju, odnosno sadnja presadnica u svibnju. Berba je u jesen. Zahtijeva često zalijevanje ili navodnjavanje, povremeno



Divovska francuska bundeva „Gargantua“

prignojavanje i dodatno zakorjenjivanje vriježa u „rezervnim“ kućicama.

Kao i ranije navedene sorte, i ova bundeva traži tlo bogato hranjivima i dobro nagnjena stajnjakom. Dobra varijanta sjetve je u neposrednoj blizini hrpe sagorjelog stajnjaka.

Od bolesti bundeva najopasnije su pepelnica i plamenjača. Pepelnica se suzbija jednim od preparata: Systhane 12E 0,03%, Tilt 250 EC 0,01%, Karathane EC 0,035%, a plamenjaču suzbija Ridomil MZ 72 WP, Polyram DF.

Damir Drvodelić, dipl. ing.



DANON d.o.o.

Ledinska 7, 10255 DONJI STUPNIK
tel.: 01/6530-985, 6531-056, 6530-843
faks: 01/6530-983
e-mail: danon@zg.t-com.hr
• www.danon.hr

VODOTOPIVA GNOJIVA, FOLIJA ZA PLASTENIKE, MALČ FOLIJA, SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

PRODAJA OPREME ZA NAVODNJAVANJE:

- PLASTENIKA
- VOĆNJAKA
- UKRASNIH POVRŠINA
- SPORTSKIH TERENA

